

# Guía de Resiembra de Césped Sin Desperdicio



CVWD les pide a Jardineros de Profesión que anime a sus clientes a no resembrar, para evitar el desperdicio de agua y que se excedan en el presupuesto de agua asignado. Si deciden resembrar, siga las guías a continuación para minimizar el consumo excesivo de agua durante la resiembra.

- 1 No se adelante a resembrar.**  
Plantar la semilla a mediados de octubre y noviembre requiere mucho menos agua para la germinación, que plantar en septiembre o a principios de octubre.
- 2 Disminuya la fertilización.**  
No fertilice 4-6 semanas antes de echar semilla para disminuir el crecimiento de lo que pronto será césped bermuda resembrado.
- 3 Prepare el semillero.**  
Dos semanas antes de sembrar, reduzca el programa de riego por 50%, y gradualmente la altura del corte del césped, hasta alcanzar la medida de ½ pulgada para el día programado para sembrar. Rastrille y remueva los recortes y basura del césped para que la semilla sembrada haga contacto con el suelo.
- 4 Ajuste el sistema de riego.**  
Revise los aspersores para el funcionamiento apropiado, nivele cabecillas laterales, y limpie boquillas tapadas.
- 5 Siga las instrucciones en la etiqueta del paquete de semilla.**  
Aplique la semilla de acuerdo con lo escrito en la etiqueta del paquete.
- 6 Asegúrese que haya buen contacto entre semilla-suelo.**  
Utilice un rodillo en el área sembrada para aumentar el contacto de semilla-suelo.
- 7 Cubra las semillas.**  
Aplique ½ -¼ de pulgada del cubre semilla al área sembrada, utilice el esparcidor de fertilizante.
- 8 Verifique que la cobertura de la semilla este completamente húmeda.**  
Humedezca la cobertura de la semilla completamente hasta el fondo de la superficie del suelo.

- 9 Ponga en práctica el siguiente programa de riego\*.**  
Inicie regando 3 minutos (cabezas rociadoras) o 10 minutos (cabezas giratorias) por riego. 5 veces al día, con intermedios de 2 horas, empezando a las 8:00 am.
- 10 Esté pendiente a la germinación del césped, en aproximadamente 7 días.**
- 11 Reduzca la frecuencia de riego después del brote temprano.**  
Cuando las hojas del césped midan 1 pulgada de largo, reduzca el riego a 3 veces por día.
- 12 No corte prematuramente o demasiado corto.**  
Siga las recomendaciones proveídas en la etiqueta del paquete de semilla para cortar el nuevo césped.
- 13 Resume el riego normal.**  
Empiece a utilizar Las Guías de Riego de CVWD después del segundo corte.

Guía de riego para el césped  
(en minutos por día)

	sept.	oct.	nov.	dic.
Cabezas rociadoras	10	7	4	3
Cabezas giratorias	22	14	10	6

Los horarios de riego varían individualmente y se basan en la eficacia de los aspersores, el tipo de suelo, y el estado del tiempo.

\* Por motivo de las diferentes zonas ETo (Evapotranspiración) y el rendimiento de los aspersores este programa recomendado para el riego de resiembra debe ser acompañado por la observación frecuente. Nunca debe permitir que la cubierta de la resiembra se seque antes del primer corte.



¡Manténgase en contacto con nosotros!

[www.cvwd.org](http://www.cvwd.org)

